

LA VACCINATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES CONTRE LA GRIPPE ET LA COQUELUCHE

Etude réalisée en Haute Saône et dans le
Territoire de Belfort

Charlène Haumont
Présidente de jury : Pr C. Mougin
Directeur : C. Pichet , Médecin Généraliste
Co-directeur : P. Moreno, Médecin Généraliste

Matériel et méthode

- ▣ Etude transversale quantitative
- ▣ Critère de jugement principal : le statut vaccinal des MG
- ▣ Questionnaire enregistré sous forme d'un formulaire dans Google et envoyé par mail aux MG via les Présidents des Conseils de l'Ordre
- ▣ Relance téléphonique
- ▣ Données collectées dans un tableau Excel
- ▣ Avantages et biais
- ▣ Taux de réponses de 39 %
- ▣ Vieillesse et féminisation de la population

Résultats grippe

- 79 % des MG déclarent se vacciner régulièrement contre la grippe saisonnière
 - Plus de 50 ans (81% vs 76,5%)
 - Hommes (83% vs 73%)
 - Exercice en groupe = seul
 - Agglomérations de faible taille
 - Sans orientation particulière de leur exercice (81% vs 76%)
 - 6 FMC et plus / an (81%)
- Facteurs favorisants
 - La protection des patients
 - La protection personnelle
 - Ne pas interrompre l'activité professionnelle
- Facteurs limitant
 - Négligence ou peur des effets secondaires
- Comparaison avec la littérature

Résultats coqueluche

- 56 % des médecins ont effectué leur rappel de coqueluche à l'âge adulte
 - Femmes (56% vs 43%)
 - Moins de 50 ans (67% vs 49%)
 - Zone moins peuplée
 - Avec orientation particulière (60% vs 54%)
 - Cabinet de groupe (57% vs 54%)
 - Moins de 6 FMC / an (62% vs 50%)
- Facteurs favorisants
 - La protection des patients
 - La protection personnelle
 - Ne pas interrompre l'activité professionnelle
- Facteurs limitant
 - 30% ont prévu de le faire au prochain rappel DTP
 - Oubli (environ 20%)
- Comparaison avec la littérature